



Floracid[®] novo

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtkälber (Saugkälber)

Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts und zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Mikroverkapselte, probiotische Milchsäure-Bakterien zur Stabilisierung der Darmflora.

Pufferkapazität:

66,1 mmol/Ltr. verfütterungsfertige Tränkeportion (berechnet nach der SIDMethode).

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 8,90 %, Rohfett 1,10 %, Rohfaser 2,00 %, Rohasche 18,20 %, Calcium 2,20 %, Natrium 5,56 %, Magnesium 1,40 %, Phosphor <0,10 %, Kalium 1,69 %, Chlorid 4,43 %

Zusammensetzung:

Dextrose, Natriumbicarbonat, Zitrustrester, Sojaproteinkonzentrat (non GMO), Natriumchlorid, Bananenmehl, Vanillin, Kaliumchlorid, Karottenmehl, Calciumgluconat, Süßmolke, Pektin, Magnesiumsulfat.

Zusatzstoffe je kg:

Sensorische Zusatzstoffe: Aromamischung (Aroma Banane 1.500mg und Vanillin (2b05018) 3.000mg), Glycin (2b17034) 40.000 mg, Enterococcus faecium NICMB 10415 (4b1705) 6x10⁹ KBE.

Technologische Zusatzstoffe: Natriumdiacetat (1a262) 5.000 mg, Kieselsäure (E551a), Klinoptilolith (1g568) 7.000 mg, entöltes Sojalecithin (1c322i) (non GMO).

Fütterungsempfehlung:

In leichten Fällen sowie nach Durchfall kann dieses Diät-Ergänzungsfuttermittel über einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen 1-2 mal täglich als Zwischentränke in der Menge von jeweils 2 Ltr. gegeben werden.

Sie können dieses Diät-Ergänzungsfuttermittel verwenden, indem Sie zwei gestrichene Messlöffel (insgesamt ca. 80 g) in ½ Ltr. lauwarmem Wasser klumpenfrei auflösen und mit körperwarmem Wasser (ca. 40 °C) auf 2 Ltr. auffüllen. Frisch zubereitet und körperwarm verfüttern. Die gleichzeitige Verfütterung von Milch sollte bei Tieren mit Labmagenverdauung vermieden werden.

Besondere Hinweise

Dicht verschlossen, kühl und trocken lagern.

Hinweis:

Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder Verlängerung der Fütterungsdauer tierärztlichen Rat einzuholen.

Produktinformation und Eigenschaften:

Diverse, verlustreiche Infektionen bei Kälbern sind ursächlich auf eine Störung der physiologischen Magen-Darm-Funktion zurückzuführen. Oft sind Fütterungsprobleme die wegbereitenden Auslöser. Hierbei kommt der Veränderung der natürlichen Bakterienflora (Dysbiose) eine wesentliche Bedeutung zu. Der Erhalt und die Unterstützung dieser natürlichen Bakterienflora sind also das primäre Ziel. Erläuterungen zu den Bestandteilen: Für die Vorbeuge, zur Unterstützung der Behandlung und in der Rekonvaleszenz von Durchfallerkrankungen besitzt Floracid® Novo wesentliche ernährungsphysiologische und diätetische Merkmale. Floracid® Novo ist frei von Antibiotika.

„Cernelle 68“ - das mikroverkapselte Probiotikum in Premium-Qualität

Als Probiotikum werden in Floracid® Novo hochdosierte, speziell mikroverkapselte, lebens- und vermehrungsfähige Milchsäure-Bakterien des Stammes *Enterococcus faecium* „Cernelle 68“ zugesetzt. Die Mikro kapsel schützt das Probiotikum zuverlässig vor Angriffen der Magensäure und schädlichen Einflüssen der Gallensalze. Nicht verkapselte Probiotika überstehen meist schon die Magenpassage nicht.

Erst im terminalen Dünndarm, Ileum und Colon vermehren sich die aus der Mikro kapsel freigesetzten Keime. Dies geschieht besonders schnell; denn „Cernelle 68“ hat eine extrem kurze Anlaufphase (lag-Phase), d.h. nach kürzester Zeit ist der Keim an das Darmmilieu adaptiert und er kommt sofort in die exponentielle log-Phase (massive Vermehrung). Die Unterstützung der physiologischen Darmflora kommt also sofort. Fremdkeime können so abgewehrt und durchfallerregernde Keime durch Keim-Konkurrenz vermindert werden. Der Körper wird unterstützt, eigene Antikörper zu bilden und die Abwehrkraft zu stärken. Bei leichten Infektionen werden Fremdkeime sogar ganz ausgeschaltet.

Elektrolyte und Mineralstoffe:

Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Chloride gleichen die durch den Kot verlorengegangenen Mengen aus und stabilisieren den Elektrolythaus-halt.

Glucose (Traubenzucker):

Glucose ist für alle Körperzellen und hier insbesondere für die Darmzellen eine direkt und rasch verwertbare Energiequelle. Sie dient als Energiespender für den Gesamtorganismus und zur schnellen Regeneration der Darmschleimhaut.

Molkenpulver mit Lactose (Milchzucker):

Mit Molkenpulver schmeckt erstens eine Tränke viel besser. Das ist sehr wichtig, denn ohne Akzeptanz keine Wirkung! Und zweitens wird die Milchverdauung weiterhin aufrechterhalten, da die lactose-spaltenden Enzyme im Dünndarm weiterhin produziert werden müssen. Die Rückkehr zur gewohnten Milchnahrung wird hierdurch erleichtert.

Floracid® novo**Lactose (Milchzucker):**

Der zusätzlich zugesetzte Milchzucker dient als Energiequelle, die längerfristig verfügbar wird. Der Blutzuckerspie-gel wird durch Glucose sofort und durch Lactose über längere Zeit unterstützt. Darüber hinaus wird Lactose von Darmbakterien zu Milchsäure umgesetzt (pH-Senkung).

Glycin:

Der Aromabestandteil Glycin (eine Aminosäure) besitzt eine große Süßkraft, Zusammen mit Glucose dient Glycin der zusätzlichen Akzeptanzerhöhung. Glycin wird auch eine Rolle bei der Rehydratation zugeschrieben, indem durch die Regelung der Wasserresorption aus dem Darm in den Körper optimiert wird (Osmoregulation).

Bananenflocken und Johannisbrotkernmehl:

Beide Einzelfuttermittel sind reich an prebiotischen Substanzen, die der positiven Dickdarmflora als Nahrung zur Verfügung stehen (Prebiotika).

Pflanzliche Pektine und faserreiche Zitrustrester:

Schleimbildende Pektine legen sich schützend auf die geschädigte Darmwand und beschleunigen die Eindickung des Darminhaltes. Faserreiche Zitrustrester können Bakterien und Toxine binden. Hierdurch werden diese unschädlich ausgeschieden und es entsteht auf diese Weise ein Darmreinigungs-Effekt.

Fütterungsempfehlungen: (Kalb, ca. 40 kg Körpergewicht):

Wann?	Was?	Wie oft?	Wie?	Wie lange?
Bei Durchfall	Floracid® novo anstelle von Milch oder Milchaustauscher	Morgens 2 Ltr. abends 2 Ltr.	Jeweils frisch angesetzt und körperwarm vertränten	2 Tage
	zusätzlich: Lytafit®-Elektrolyttränke bei starker Dehydration (Austrocknung)	2 . 4 Ltr. Ständig zur Freien Aufnahme anbieten	Morgens und abends frisch ansetzten	2 Tage
Nach Durchfall sowie in leichten Fällen	Milch oder Milchaustauscher als Haupttränke	Morgens und abends 1 . 2 x täglich	Jeweils frisch angesetzt und körperwarm vertränten	bis zu 7 Tage
	zusätzlich: Floracid® novo	2 Ltr. Als Extra-Portion		