

GEBRAUCHSINFORMATION

# Nystatin Dechra

## 100.000 I.E./ml

Suspension zum Eingeben für  
Hauskaninchen, Kleinnager,  
Frettchen oder Ziervögel,  
Brieftauben und Terrarium-Tiere

**NAME UND ANSCHRIFT DES  
PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS  
UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES  
HERSTELLERS DER FÜR DIE  
CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST  
PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER**

Dechra Veterinary Products GmbH  
Deutschland, Hauptstraße 6 - 8, 88326  
Aulendorf, Deutschland

**FÜR DIE CHARGENFREIGABE  
VERANTWORTLICHER HERSTELLER**  
Biokanol Pharma GmbH, Kehler Straße 7,  
76437 Rastatt, Deutschland

**BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**  
Nystatin Dechra 100.000 I.E./ml Suspension  
zum Eingeben für Hauskaninchen, Kleinnager,  
Frettchen oder Ziervögel, Brieftauben und  
Terrarium-Tiere

**WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE  
BESTANDTEILE**

1 ml enthält:  
Wirkstoff: 100.000 I.E. Nystatin  
Sonstige Bestandteile: Saccharose  
Gelbe Suspension mit Geruch und Geschmack  
nach Himbeere.

**ANWENDUNGSGEBIET(E)**  
Hefepilzinfektionen im Magen-Darmtrakt.

**GEGENANZEIGEN**  
Bekannte Überempfindlichkeit gegen Nystatin  
oder einen der sonstigen Bestandteile des  
Arzneimittels.

**NEBENWIRKUNGEN**  
Keine bekannt. Falls Sie eine Nebenwirkung  
bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die  
nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist,  
teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder  
Apotheker mit.

**ZIELTIERART(EN)**  
Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen oder  
Ziervögel, Brieftauben und Terrarium-Tiere.

**DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART  
UND DAUER DER ANWENDUNG**  
Schmackhafte Suspension zum  
Eingeben.



Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen,  
Ziervögel, Brieftauben und Terrarium-Tiere:  
1 ml/kg Körpergewicht 2-mal täglich über  
14 Tage vorzugsweise über schmackhaftes  
Futter verabreichen oder mit einer Einmalspritze  
in den Mund des Tieres eingeben.

**HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE  
ANWENDUNG**

Flasche vor Gebrauch gut schütteln.  
Zur Entnahme der Suspension Verschlusskappe  
abdrehen.  
Originalpackung mit 48 ml Suspension  
(mit Dosierpumpe): 1 Hub entspricht 0,5 ml.  
2 Hübe entsprechen 1 ml.  
Flasche nach Entnahme verschließen.

**WARTEZEIT(EN)**  
Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der  
Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

**BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder  
aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.  
Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar.  
Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis  
und äußerer Umhüllung angegebenen  
Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

**BESONDERE WARNHINWEISE**

Für Tiere mit Diabetes mellitus ist der Gehalt  
an Saccharose zu beachten.

**BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN  
FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT  
VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER  
VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN  
ERFORDERLICH**

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel  
sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen  
abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung  
mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass  
kein missbräuchlicher Zugriff auf diese  
Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen  
nicht mit dem Abwasser bzw. über die  
Kanalisation entsorgt werden.

**WEITERE ANGABEN**

Originalpackung mit 48 ml Suspension in  
einer Braunglasflasche mit Dosierpumpe im  
Faltkarton.

SJ210904

