

## GEBRAUCHSINFORMATION FÜR

Meloxoral 0,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Katzen

### 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:

Le Vet B.V  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
NIEDERLANDE

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Produlab Pharma B.V.  
Forellenweg 16  
4941 SJ Raamsdonksveer  
NIEDERLANDE

### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Meloxoral 0,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Katzen  
Meloxicam

### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Ein ml enthält:  
Meloxicam 0,5 mg.  
Gelbgrüne Suspension.

### 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Linderung von Schmerzen und Entzündungen bei chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Katzen.

### 5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei Katzen, die an gastrointestinalen Störungen wie Irritationen und Blutungen, an einer beeinträchtigten Leber-, Herz- oder Nierenfunktion und an Störungen der Blutgerinnung leiden. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.  
Nicht anwenden bei Katzen, die jünger als 6 Wochen sind.

### 6. NEBENWIRKUNGEN

Typische Nebenwirkungen von nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAIDs) wie Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, okkultes Blut im Kot, Apathie und Nierenversagen wurden in Einzelfällen berichtet. In sehr seltenen Fällen wurde über erhöhte Leberenzyme berichtet. Diese Nebenwirkungen sind meist vorübergehend und klingen nach Abbruch der Behandlung ab, können aber in sehr seltenen Fällen auch schwerwiegend oder lebensbedrohlich sein.

Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Behandlung abgebrochen werden und der Rat des Tierarztes eingeholt werden.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen während der Behandlung)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## **7. ZIELTIERART(EN)**

Katzen

## **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Mit dem Futter vermischt oder direkt in den Fang zu verabreichen.

### **Dosierung**

Zur Initialbehandlung wird eine Dosis von 0,1 mg Meloxicam/kg Körpergewicht am ersten Tag der Behandlung eingegeben. Zur Weiterbehandlung (im Abstand von 24 Stunden) ist eine Erhaltungsdosis von 0,05 mg Meloxicam/kg Körpergewicht einmal täglich einzugeben.

Eine Besserung der Symptome wird normalerweise innerhalb von 7 Tagen beobachtet. Tritt keine klinische Besserung ein, sollte die Behandlung spätestens 14 Tage nach Therapiebeginn abgebrochen werden.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Die Suspension kann mit der beiliegenden Meloxoral-Dosierspritze verwendet werden.

Die Spritze passt auf den Tropfeinsatz der Flasche und besitzt eine Skala nach kg Körpergewicht, welche der Erhaltungsdosis entspricht. Für den Therapiebeginn am ersten Tag wird also die zweifache Menge des Erhaltungsvolumens benötigt.

Nach jeder Gabe muss die Spitze der Spritze abgewischt und der Flaschenverschluss wieder fest aufgeschraubt werden. Die Spritze sollte zwischen den Anwendungen im Karton aufbewahrt werden. Um das Eindringen von äußeren Verunreinigungen bei der Verwendung zu vermeiden, sollte die mitgelieferte Spritze nur für dieses Produkt verwendet werden.

Auf eine genaue Dosierung ist besonders zu achten.

Bitte folgen Sie genau den Anweisungen Ihres Tierarztes.

## **10. WARTEZEIT**

Nicht zutreffend.

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 6 Monate

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton und dem Behältnis angegebenen Verfalldatum (Verwendbar bis/ EXP) nicht mehr verwenden.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Nicht anwenden bei dehydrierten, hypovolämischen oder blutdruckschwachen Tieren, da hier ein potentielles Risiko einer erhöhten Nierentoxizität besteht.

Die Reaktion auf eine Langzeittherapie sollte in regelmäßigen Abständen durch einen Tierarzt überwacht werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber NSAIDs sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Trächtigkeit und Laktation:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während Trächtigkeit und Laktation ist nicht belegt (siehe Abschnitt 4.3).

Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Andere NSAIDs, Diuretika, Antikoagulantien, Aminoglykosid-Antibiotika und Substanzen mit einer hohen Plasma-Protein-Bindung können um die Protein-Bindung konkurrieren und somit zu toxischen Effekten führen. Meloxoral sollte nicht zusammen mit anderen NSAIDs oder Glukokortikoiden verabreicht werden. Die gleichzeitige Verabreichung potentiell nephrotoxischer Tierarzneimittel sollte vermieden werden.

Eine Vorbehandlung mit entzündungshemmenden Substanzen kann zusätzliche oder verstärkte Nebenwirkungen hervorrufen, daher sollte vor einer Weiterbehandlung eine behandlungsfreie Zeit mit diesen Tierarzneimitteln von mindestens 24 Stunden eingehalten werden. Bei der Dauer der behandlungsfreien Zeit sollten jedoch immer die pharmakologischen Eigenschaften der zuvor verabreichten Präparate berücksichtigt werden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel):

Meloxicam hat eine geringe therapeutische Breite bei Katzen, und klinische Zeichen einer Überdosierung können schon bei verhältnismäßig geringer Überschreitung der Dosis beobachtet werden.

Im Falle einer Überdosierung sind Nebenwirkungen, wie im Abschnitt „Nebenwirkungen“ aufgeführt, stärker und häufiger zu erwarten. Im Falle einer Überdosierung sollte eine symptomatische Behandlung eingeleitet werden.

## **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

#### 14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Detaillierte Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie auf der Website der Europäischen Arzneimittel-Agentur unter <http://www.ema.europa.eu/>.

#### 15. WEITERE ANGABEN

Flaschen mit 5, 10 oder 25 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

##### **België/Belgique/Belgien**

Kela Veterinaria N.V./S.A.  
Industriepark west 68  
9100 Sint-Niklaas  
Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390  
info@kelavet.be

##### **Luxembourg/Luxemburg**

Kela Veterinaria N.V./S.A.  
Industriepark west 68  
9100 Sint-Niklaas  
BELGIUM  
Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390  
info@kelavet.be

##### **Република България**

Le Vet B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
THE NETHERLANDS  
Tel: +31-(0)348-565858  
info@levetpharma.com

##### **Magyarország**

Medicus Partner Kft.  
Vendel Park,  
Tormasrét u. 12  
2051 Biatorbágy  
Tel.: +36-(0) 23530540  
medicus@vetcentre.com

##### **Česká republika**

Sevaron, Ltd.  
Palackého třída 163a  
612 00 Brno  
Tel: +420 541426379  
info@sevaron.cz

##### **Malta**

Agrimed Ltd.  
Mdina Road  
Zebbug ZBG-06  
Tel.: +356 -(0)21-465797  
info@agrimedltd.com

##### **Danmark**

Sogeval ApS  
Strømmen 6  
9400 Nørresundby  
Tel: +45-(0)30-460 550  
info@sogeval.dk

##### **Nederland**

Le Vet B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Tel: +31-(0)348-565858  
info@levetpharma.com

##### **Deutschland**

Le Vet B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Tel: +31-(0)348-565858  
info@levetpharma.com

##### **Norge**

Le Vet B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Tel: +31-(0)348-565858  
info@levetpharma.com

**Eesti**

AS Dimedium  
Emajõe 1a,  
Tartu 51008  
Tel: +372 (0)739 0660

**Ελλάδα**

Petline S.A.  
Finos Film Road, Thesi Xousmiza  
19004 Spata-Attikis  
Τηλ: +30-(0)210 6069800  
info@petline.gr

**España**

Fatro Iberica S.L.  
Constitución 1, Planta Baja 3  
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)  
Tel: + 34-(0)93-473 55 44  
info@fatroiberica.es

**France**

Osalia  
Rue Raffet 27-29  
75016 Paris  
Tel : +33 (0) 1 40505410

**Ireland**

NutriScience Ltd  
Unit 622  
Northern Extension IDA Industrial Estate  
Waterford  
Tel: +353 51 304010

**Ísland**

Icevet  
Krokhalsi 14  
110 Reykjavik  
Sími: +354 5344030

**Italia**

Fatro S.p.A.  
Via Emilia, 285  
40064 Ozzano Emilia (Bologna)  
Tel: +39 051 6512711  
info@fatro.it

**Österreich**

VANA GmbH  
Wolfgang Schmälzl-Gasse 6  
1020 Wien  
Tel: +43-(01)-728 03670  
office@vana.at

**Polska**

Fatro Polska Sp.z o.o  
ul. Bolońska 1  
55 040 Kobierzyce  
Tel.: +48-(0)71-311 11 11  
office@fatro-polska.com.pl

**Portugal**

Fatro Iberica S.L.  
Constitución 1, Planta Baja 3  
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)  
SPAIN  
Tel: + 34-(0)93-473 55 44  
info@fatroiberica.es

**România**

Medicus Partner Kft.  
Vendelpark, Tormasrét u. 12  
2051 Biatorbagy  
HUNGARY  
Tel: +36-(0) 23530540  
medicus@vetcentre.com

**Slovenija**

TPR d.o.o.  
Litostrojska c. 44E  
1000 Ljubljana  
Tel: + 386 1 505 58 82

**Slovenská republika**

Sevaron, Ltd.  
Palackého trída 163a  
612 00 Brno  
CZECH REPUBLIC  
Tel: +420 541426379  
info@sevaron.cz

**Suomi/Finland**

FaunaPharma Oy  
PO Box 12  
FIN-02211 Espoo  
Puh/Tel: +358 45 2300 665  
info@faunapharma.fi

**Κύπρος**

Petline S.A.  
Finos Film Road, Thesi Xousmiza  
19004 Spata-Attikis  
GREECE  
Τηλ: +30-(0)210 6069800  
info@petline.gr

**Sverige**

VM Pharma AB  
Box 45010  
SE-104 30 Stockholm  
Tel: +358 (0) 3 630 3100  
info@vetmedic.se

**Latvija**

AS Dimedium  
Emajõe 1a,  
Tartu 51008  
Tel: +372 (0)739 0660

**United Kingdom**

NutriScience Ltd  
Unit 622  
Northern Extension IDA Industrial Estate  
Waterford  
Tel: +353 51 304010

**Lietuva**

AS Dimedium  
Emajõe 1a,  
Tartu 51008  
Tel: +372 (0)739 0660

**Hrvatska**

Genera  
Svetonedeljska 2  
Kalinovica  
HR-10436 Rakov Potok  
Tel: +385 1 33 88 602  
info@genera.hr